

ГРИПП ПТИЦ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание , возбудителем которого является вирус.
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой и дикой птицей.

У заболевших диких и домашних птиц отмечается необычное поведение дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Опасны выделения зараженных птиц, которые попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным путем, и через грязные руки. Следует помнить , что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется , но нагревание до температуры + 70 °С убивает вирус за несколько минут.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА.

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до + 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затрудненное дыхание. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения , так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ.

В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон, амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ.

В целях предотвращения падежа домашней птицы(бывает и молниеносная форма гриппа птиц без клинических признаков) и заболеваний человека гриппом птиц, гражданам , имеющим в хозяйстве домашнюю птицу, рекомендуется произвести забой имеющегося поголовья и использовать мясо в пищу.

Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.

Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц.Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченную воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.